

附件2

大豆玉米带状复合种植病虫害防控用药建议表

病虫害种类	防治用药	施药方法
地下害虫	氯虫苯甲酰胺、溴氰·噻虫嗪、金龟子绿僵菌 CQMa421、吡虫啉	拌种
基部病害	精甲·咯菌腈、萎锈·福美双、甲霜·多菌灵、多·福·甲维盐、丁硫·福美双、阿维·多·福、噻虫·福·萎锈、苯甲·嘧菌酯、精甲霜灵	拌种
叶部病害	吡唑醚菌酯、丙环·嘧菌酯、唑醚·氟环唑；锈病用苯甲·丙环唑、嘧菌酯	喷雾
食叶和钻蛀性害虫	苏云菌杆菌、氯虫苯甲酰胺、四氯虫酰胺、甲维盐、金龟子绿僵菌、球孢白僵菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒	喷雾
穗期病害	丙环·嘧菌酯、氟唑·嘧菌酯、嘧菌·戊唑醇、肟菌·戊唑醇、氟唑·福美双、氟硅唑、三唑酮、吡唑醚菌酯、唑醚·戊唑醇	喷雾
播前灭茬	草铵膦、草甘膦	喷雾
芽前封闭除草	精异丙甲草胺（或乙草胺、异丙甲草胺、二甲戊灵）+ 唑嘧磺草胺（或噻吩磺隆）等单剂及其复配剂或噻草酮	喷雾
玉米带 杂草2~4叶期	噻吩磺隆或硝磺草酮·莠去津、烟嘧磺隆+氯氟吡氧乙酸（或二氯吡啶酸、灭草松）	定向 喷雾
大豆带 杂草2~4叶期	精喹禾灵乳油+氟磺胺草醚、精喹禾灵（或高效氟吡甲禾灵、精吡氟禾草灵、烯草酮）+乙羧氟草醚（或灭草松）	

注：严格按照农药标签规定的作物和防治对象以及剂量使用。